

**LIITE I**  
**VALMISTEYHTEENVETO**

## 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

Equip WNV injektioneste, emulsio, hevoselle

## 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

1 ml:n annos sisältää:

Vaikuttava aine:

Inaktivoitu Länsi-Niilin virus, kanta VM-2 RP\* 1,0–2,2

\*Suhteellinen teho *in vitro* verrattuna hevosilla tehokkaaksi osoitettuun vertailurokotteeseen.

Adjuvantti:

MetaStim™ (SP-öljy) 0,05 ml

Täydellinen apuaineluettelo, katso kohta 6.1.

## 3. LÄÄKEMUOTO

Injektioneste, emulsio.

## 4. KLIINiset TIEDOT

### 4.1 Kohde-eläinlajit

Hevonen.

### 4.2 Käyttöaiheet kohde-eläinlajeittain

Vähintään 6 kk ikäisten tai sitä vanhempien hevosten aktiivinen immunisaatio Länsi-Niilin virusta vastaan vireemisten hevosten määrän vähentämiseksi.

Immuunisuojan alkaminen: 3 viikon kuluttua perusrokotuksesta.

Immuunisuojan kesto: 12 kk perusrokotuksesta.

### 4.3 Vasta-aiheet

Ei ole.

### 4.4 Erityisvaroitukset

Ei ole

### 4.5 Käyttöön liittyvät erityiset varotoimet

#### Eläimiä koskevat erityiset varotoimet

Ainoastaan terveitä eläimiä tulee rokottaa.

Rokotus voi vaikuttaa seroepidemiologisten tutkimusten tuloksiin. Rokotuksen jälkeen kehittyy kuitenkin vain suhteellisen harvoin IgM-vaste, joten positiivinen IgM-tulos ELISA-testissä viittaa

voimakkaasti luonnolliseen Länsi-Niilin viruksen aiheuttamaan infektiin. Jos eläimellä epäillään infektiota positiivisen IgM-vasteen vuoksi, on tehtävä lisätutkimuksia ja selvitettävä, onko eläin saanut infektiin vai rokotuksen.

Maternaalisten vasta-aineiden mahdollista vaikutusta rokotteen tehoon ei ole tutkittu. Siksi on suositeltavaa, että alle 6 kk ikäisiä varsoja ei rokoteta.

### **Erityiset varoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava**

Injisoihtaessa valmistetta vahingossa itseensä tai kun sitä on nielty tai läikkynyt iholle, on käännyttävä välittömästi lääkärin puoleen ja näytettävä tälle pakkausselostetta tai myyntipäilystä.

#### **4.6 Haittavaikutukset (yleisyys ja vakavuus)**

Joillakin eläimillä saattaa esiintyä ohimeneviä paikallisreaktioita, jotka ilmenevät pistoskohdan lievänä paikallisena turvotuksena (läpimitta enintään 1 cm) rokotuksen jälkeen ja paranevat itsestään 1-2 päivässä. Joskus tähän liittyy kipua ja lievää alakuloisuutta. Joissakin tapauksissa voi esiintyä lämmön nousua enintään 2 päivän ajan.

#### **4.7 Käyttö tiineyden, laktaation tai muninnan aikana**

Voidaan käyttää tiineyden ja imetyksen aikana.

Kantavilla tammoilla ei ole tehty spesifisiä tehokkuustutkimuksia. Tiineyden aikana mahdollisesti havaittavan ohimenevän immuunitoiminnan heikkenemisen vaikutusta rokotteen tehoon, ei siis voida sulkea pois.

#### **4.8 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset**

Rokotteen tehosta ja turvallisuudesta ei ole tietoa käytettäessä rokotetta samanaikaisesti muiden eläinlääkkeiden kanssa. Siksi tämän valmisteen käytöstä ennen tai jälkeen jonkin muun eläinlääkevalmisteen käyttöä on päätettävä tapauskohtaisesti.

#### **4.9 Annostus ja antotapa**

Lihakseen.

Yksi annos (1 ml) syväälle lihakseen kaulan alueelle seuraavan ohjelman mukaisesti:

- Perusrokotus: ensimmäinen injektio aikaisintaan 6 kk iässä, toinen injektio 3-5 viikkoa myöhemmin.
- Uusintarokotus: vuosittaisella tehosterokotuksella (kerta-annos) saavutetaan todennäköisesti riittävä suoja, vaikka tätä rokotusohjelmaa ei ole täysin vahvistettu.

#### **4.10 Yliannostus (oireet, hätätoimenpiteet, vastalääkkeet) (tarvittaessa)**

Kaksinkertaisen rokoteannoksen antamisen jälkeen ei ole havaittu muita kuin kohdassa 4.6 mainittuja haittavaikutuksia.

#### **4.11 Varoaika**

Nolla vrk.

## **5. IMMUNOLOGISET OMINAISUUDET**

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Immunologiset valmisteet hevoselle – Inaktivoidut virusrokotteet -  
Länsi-Niilin virusrokote.  
ATCvet-koodi: QI05AA10

Rokote saa aikaan aktiivisen immunitetina Länsi-Niilin virusta vastaan.

## **6. FARMASEUTTISET TIEDOT**

### **6.1 Apuaineet**

Minimum Essential Medium -elatusaine (MEM)

### **6.2 Yhteensopimattomuudet**

Ei saa sekoittaa muiden eläinlääkevalmisteiden kanssa.

### **6.3 Kesto aika**

Avaamattoman pakkauksen kesto aika: 2 vuotta.

### **6.4 Säilytystä koskevat erityiset varotoimet**

Säilytä ja kuljeta kylmässä (2 °C – 8 °C).

Ei saa jäätyä.

Säilytä valolta suojassa.

### **6.5 Pakkaustyyppi ja sisäpakkauksen kuvaus**

Polypropeenista valmistettu kerta-annosruisku (1 ml), joka on suljettu lateksittomalla tyyppin I kumikärjellä.

Kotelo, jossa 5 polypropeenista valmistettua kerta-annosruiskua.

Kotelo, jossa 10 polypropeenista valmistettua kerta-annosruiskua.

Kotelo, jossa 25 polypropeenista valmistettua kerta-annosruiskua.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla

### **6.6 Erityiset varotoimet käyttämättömien lääkevalmisteiden tai niistä peräisin olevien jättemateriaalien hävittämiselle**

Käyttämättömät eläinlääkevalmisteet tai niistä peräisin olevat jättemateriaalit on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti.

## **7. MYYNTILUVAN HALTIJA**

Pfizer Limited  
Ramsgate Road  
Sandwich, Kent  
CT13 9NJ  
Iso-Britannia

## **8. MYYNTILUVAN NUMERO(T)**

EU/2/08/086/001  
EU/2/08/086/002  
EU/2/08/086/003

**9. ENSIMMÄISEN MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ  
/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ**

21/11/2008

**10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ**

Tätä eläinlääkevalmistetta koskevaa yksityiskohtaista tietoa on saatavilla Euroopan lääkeviraston (EMA) verkkosivuilla osoitteessa <http://www.ema.europa.eu/>.

**MYYNTIÄ, TOIMITTAMISTA JA/TAI KÄYTTÖÄ KOSKEVA KIELTO**

Equip WNV maahantuonti, myynti, toimittaminen ja/tai käyttö on tai voi olla kiellettyä tietyissä jäsenvaltioissa niiden koko alueella tai joillakin niiden alueilla kansallisten eläintautisäädösten perusteella. Jokaisen sellaisen henkilön, jonka aikomuksena on Equip WNV maahantuonti, myynti, toimittaminen ja/tai käyttö, on otettava ensin yhteyttä asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaiseen viranomaiseen maahantuontia, myyntiä, toimittamista ja/tai käyttöä koskevien rokotusmääräysten selvittämiseksi.

## **LIITE II**

- A. BIOLOGISEN (BIOLOGISTEN) VAIKUTTAVAN (VAIKUTTAVIEN) AINEEN (AINEIDEN) VALMISTAJA (VALMISTAJAT) JA > ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA(T) VALMISTAJA(T)**
- B. TOIMITTAMISEEN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT EHDOT TAI RAJOITUKSET**
- C. SELVITYS JÄÄMIEN ENIMMÄISMÄÄRISTÄ**
- D. MYYNTILUVAN MUUT EHDOT JA EDELLYTYKSET**

**A. BIOLOGISEN (BIOLOGISTEN) VAIKUTTAVAN (VAIKUTTAVIEN) AINEEN (AINEIDEN) VALMISTAJA (VALMISTAJAT) JA > ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA(T) VALMISTAJA(T)**

Biologisen vaikuttavan aineen (biologisten vaikuttavien aineiden) valmistajan nimi ja osoite

Boehringer IngelheimFort Dodge Animal Health  
Vetmedica, Inc.  
141 East Riverside Drive  
Fort Dodge, Iowa 50501  
USA

Erän vapauttamisesta vastaavien valmistajien nimi ja osoite

Elanco Animal Health Ireland Limited Finisklin Industrial Estate  
Sligo  
Irlanti

**B. TOIMITTAMISTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT LIITTYVÄT EHDOT TAI RAJOITUKSET**

Eläinlääkemääräys.

Euroopan parlamentin ja neuvoston muutetun direktiivin 2001/82/EY 71 artiklan mukaisesti jäsenvaltiot kieltävät tai voivat kieltää Equip WNV:n maahantuonnin, myynnin, jakelun ja/tai käytön koko alueellaan tai osassa sitä, jos osoitetaan, että:

- a) eläinlääkevalmisteen käyttäminen on ristiriidassa niiden kansallisten ohjelmien kanssa, jotka koskevat eläintautien diagnosointia, valvontaa tai hävittämistä, tai valmisteen käyttö vaikeuttaa sen varmistamista, että kontaminaatiota ei esiinny elävissä eläimissä tai rokotetuista eläimistä peräisin olevissa elintarvikkeissa tai muissa tuotteissa.
- b) tautia, jota vastaan valmisteen on tarkoitus antaa immuniteetti, ei esiinny suuressa määrin kyseisellä alueella.

**C. SELVITYS JÄÄMIEN ENIMMÄISMÄÄRISTÄ**

Asetusta (EY) No 470/2009 ei sovelleta immunologisissa eläinlääkkeissä käytettäviin, biologista alkuperää oleviin vaikuttaviin aineisiin, joilla on tarkoitus saada aikaan aktiivinen immuniteetti.

Valmisteyhteenvedon kappaleessa 6.1. luetellut apuaineet ovat joko sallittuja aineita, joille Komission asetuksen 37/2010 liitteen taulukon 1 mukaisesti ei tarvita jäämien enimmäismäärää tai niiden ei katsota kuuluvan Asetuksen (EU) No 470/2009 soveltamisalaan kun niitä käytetään kuten tässä eläinlääkevalmistuksessa.

**D. MYYNTILUVAN MUUT EHDOT JA EDELLYTYKSET**

Lääketurvajärjestelmä

Myyntiluvan haltijan on varmistettava, että myyntilupahakemuksen osassa I kuvattu lääketurvajärjestelmä on olemassa ja toiminnassa ennen eläinlääkevalmisteen markkinoille tuloa ja niin kauan kuin eläinlääkevalmiste on markkinoilla.

**LIITE III**

**MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE**

## **A. MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT**

## ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT TIEDOT

Kotelo, jossa 5, 10, 25 kerta-annos polypropyleeniruiskua

### 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

Equip WNV injektioneste, emulsio, hevoselle

### 2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) JA MUUT AINEET

1 m:nl annos sisältää:

Vaikuttava aine:

Inaktivoitu Länsi-Niilin virus, kanta VM-2 RP\* 1,0–2,2

\*Suhteellinen teho *in vitro* verrattuna hevosilla tehokkaaksi osoitettuun vertailurokotteeseen.

Adjuvantti:

MetaStim™ (SP-öljy) 0,05 ml

### 3. LÄÄKEMUOTO

Injektioneste, emulsio

### 4. PAKKAUSKOKO

1 x 5 kerta-annosruiskua

1 x 10 kerta-annosruiskua

1 x 25 kerta-annosruiskua

### 5. KOHDE-ELÄINLAJI(T)

Hevonen.

### 6. KÄYTTÖAIHEET

Vähintään 6 kk ikäisten tai sitä vanhempien hevosten aktiivinen immunisaatio Länsi-Niilin virusta vastaan vireemisten hevosten määrän vähentämiseksi.

### 7. ANTOTAPA JA ANTOREITTI(ANTOREITIT)

Lihakseen.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

### 8. VAROAIKA

Varo aika: Nolla vrk.

**9. TARVITTAESSA ERITYISVAROITUS(ERITYISVAROITUKSET)**

**10. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ**

EXP {KK/VVVV}

**11. SÄILYTYSOLOSUHTEET**

Säilytä ja kuljeta kylmänä (2 °C–8 °C).

Ei saa jäätyä.

Säilytä valolta suojassa.

**12. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI**

Hävitys: Lue pakkausseloste.

**13. MERKINTÄ “ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, jos tarpeen**

Eläimille.

Vain eläinlääkärin määräyksestä.

Tämä eläinlääkkeen maahantuonti, myynti, toimittaminen ja/tai käyttö on kielletty tai se saatetaan kieltää joissakin jäsenvaltioissa niiden koko alueella tai osassa niiden aluetta. Katso pakkausseloste lisätietojen saamiseksi.

**14. MERKINTÄ “EI LASTEN ULOTTUVILLE EIKÄ NÄKYVILLE.”**

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

**15. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE**

Pfizer Limited  
Ramsgate Road  
Sandwich, Kent  
CT13 9NJ  
Iso-Britannia

**16. MYYNTILUPIEN NUMEROT**

EU/2/08/086/001  
EU/2/08/086/002  
EU/2/08/086/003

**17. VALMISTAJAN ERÄNUMERO**

Lot {numero}

**PIENISSÄ SISÄPAKKAUSYKSIKÖISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT  
TIEDOT**

**Kerta-annosuisku**

**1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI**

Equip WNV injektioneste, emulsio, hevoselle

**2. VAIKUTTAVIEN AINEIDEN MÄÄRÄT**

Inaktivoitu Länsi-Niilin virus, kanta VM-2 (RP\* 1,0–2,2)

**3. SISÄLLÖN PAINO, TILAVUUS TAI ANNOSMÄÄRÄ**

1 ml

**4. ANTOREITIT**

Lihakseen.

**5. VAROAIKA**

Varoaika: Nolla vrk.

**6. ERÄNUMERO**

Lot{numero}

**7. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ**

EXP {KK/VVVV}

**8. MERKINTÄ “ELÄIMILLE”**

Eläimille.

## **B. PAKKAUSSELOSTE**



Joillakin eläimillä saattaa esiintyä ohimeneviä paikallisreaktioita, jotka ilmenevät pistoskohdan lievänä paikallisena turvotuksena (läpimitta enintään 1 cm) rokotuksen jälkeen ja paranevat itsestään 1-2 päivässä. Joskus tähän liittyy kipua ja lievää alakuloisuutta. Joissakin tapauksissa voi esiintyä lämmönnousua enintään 2 päivän ajan.

Jos havaitset vakavia vaikutuksia tai joitakin muita sellaisia vaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä selosteessa, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi.

## **7. KOHDE-ELÄINLAJIT**

Hevonen.

## **8. ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN**

Lihakseen.

Yksi annos (1 ml) syvälle lihakseen kaulan alueelle seuraavan ohjelman mukaisesti:

- Perusrokotus: ensimmäinen injektio aikaisintaan 6 kk iässä, toinen injektio 3-5 viikkoa myöhemmin.
- Uusintarokotus: vuosittaisella tehosterokotuksella (kerta-annos) saavutetaan todennäköisesti riittävä suoja, vaikka tätä rokotusohjelmaa ei ole täysin vahvistettu.

## **9. ANNOSTUSOHJEET**

Ei oleellinen

## **10. VAROAIKA**

Nolla vrk.

## **11. SÄILYTYSOLOSUHTEET**

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä ja kuljeta kylmässä (2 °C – 8 °C).

Ei saa jäätyä.

Säilytä valolta suojassa.

## **12. ERITYISVAROITUKSET**

Ainoastaan terveitä eläimiä tulee rokottaa.

Rokotteen tehosta ja turvallisuudesta ei ole tietoa käytettäessä rokotetta samanaikaisesti muiden eläinlääkkeiden kanssa. Siksi tämän valmisteen käytöstä ennen tai jälkeen jonkin muun eläinlääkevalmisteen käyttöä on päätettävä tapauskohtaisesti.

Duvaxyn WNV suojaa useimmat luonnollisen infektion saaneet hevoset vireemialta, mutta ei täysin estä sitä.

## **Eläimiä koskevat erityiset varotoimet**

Rokotus voi vaikuttaa seroepidemiologisten tutkimusten tuloksiin. Rokotuksen jälkeen kehittyä kuitenkin vain suhteellisen harvoin IgM-vaste, joten positiivinen IgM-tulos ELISA-testissä viittaa voimakkaasti luonnolliseen Länsi-Niilin viruksen aiheuttamaan infektiin. Jos eläimellä epäillään infektiota positiivisen IgM-vasteen vuoksi, on tehtävä lisätutkimuksia ja selvitettävä, onko eläin saanut infektiin vai rokotuksen.

Maternaalisten vasta-aineiden mahdollista vaikutusta rokotteen tehoon ei ole tutkittu. Siksi on suositeltavaa, että alle 6 kk ikäisiä varsoja ei rokoteta.

Voidaan käyttää tiineyden ja imetyksen aikana. Kantavilla tammoilla ei ole tehty spesifisiä tehokkuustutkimuksia. Tiineyden aikana mahdollisesti havaittavan ohimenevän immuunitoiminnan heikkenemisen vaikutusta rokotteen tehoon, ei siis voida sulkea pois.

## **Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava**

Injisoitaessa valmistetta vahingossa itseensä tai kun sitä on nieltä tai läikkynyt iholle, on käännyttävä välittömästi lääkärin puoleen ja näytettävä tälle pakkausselostetta tai myyntipäällystä.

## **13. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI**

Kysy eläinlääkärisi neuvoa tarpeettomiksi käyneiden lääkeaineiden hävittämisestä. Nämä toimet on tarkoitettu ympäristön suojelemiseksi.

## **14. PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY**

Tätä valmistetta koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavilla Euroopan lääkeviraston (EMA) verkkosivuilla osoitteessa: <http://www.ema.europa.eu/>.

## **15. MUUT TIEDOT**

Eläimille.

Vain eläinlääkärin määräyksestä.

Kotelo, jossa 5 polypropeenista valmistettua kerta-annosuiskua.

Kotelo, jossa 10 polypropeenista valmistettua kerta-annosuiskua.

Kotelo, jossa 25 polypropeenista valmistettua kerta-annosuiskua.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.

Equip WNV -valmisteen maahantuonti, myynti, toimittaminen ja/tai käyttö on tai voi olla kiellettyä tietyissä jäsenvaltioissa niiden koko alueella tai joillakin niiden alueilla kansallisten eläintautisäädösten perusteella. Jokaisen sellaisen henkilön, jonka aikomuksena on Equip WNV-valmisteen maahantuonti, myynti, toimittaminen ja/tai käyttö, on otettava ensin yhteyttä asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaiseen viranomaiseen maahantuontia, myyntiä, toimittamista ja/tai käyttöä koskevien rokotusmääräysten selvittämiseksi.

Lisätietoja tästä eläinlääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijan paikalliselta edustajalta.

**België/Belgique/Belgien**  
Pfizer Animal Health s.a.,  
Tél/Tel.: +32 (0)2 554 62 11

**Република България**  
Pfizer Luxembourg SARL  
Тел: + 359 2 970 41 71

**Česká republika**  
Pfizer Animal Health  
Tel: +420 283 004 111

**Danmark**  
Pfizer Oy Animal Health,  
Tlf: +358 (0)9 4300 40

**Deutschland**  
Pfizer GmbH  
Tel: +49 30-5500 5501

**Eesti**  
Pfizer Animal Health  
Tel: +370 525 14000

**Ελλάδα**  
Pfizer Hellas A.E.  
Τηλ.: +30 210 6785800

**España**  
Pfizer S.L.  
Tel: +34 91 4909900

**France**  
Pfizer  
Tél: +33 (0)1 58 07 46 00

**Ireland**  
Pfizer Healthcare Ireland, Trading As:  
Pfizer Animal Health  
Sími: +353 (0) 1 467 6500

**Ísland**  
Pfizer Oy Animal Health,  
Tel: +358 (0)9 4300 40

**Italia**  
Pfizer Italia S.r.l.,  
Tel: +39 06 3318 2933

**Κύπρος**  
Pfizer Hellas A.E.  
Τηλ.: +30 210 6785800

**Luxembourg**  
Pfizer Animal Health s.a.,  
Tél. /Tel: + 32 (0)2 554 62 11

**Magyarország**  
Pfizer Kft.  
Tel: +361 488 3695

**Malta**  
Agrimed Limited  
Tel: +356 21 465 797

**Nederland**  
Pfizer Animal Health B.V.,  
Tel: +31 (0)10 4064 600

**Norge**  
Pfizer Oy Animal Health,  
Tlf: +358 (0)9 4300 40

**Österreich**  
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.  
Tel: +43 (0)1 52 11 57 20

**Polska**  
Pfizer Trading Polska Sp. z.o.o.  
Tel: +48 22 335 61 00

**Portugal**  
Laboratórios Pfizer, Lda.  
Tel: +351 21 423 55 00

**Romania**  
Pfizer Romania SRL  
Tel: + 0040 21 207 28 00

**Slovenija**  
Pfizer Luxembourg SARL  
Tel: +386 (0) 1 52 11 670

**Slovenská republika**  
Pfizer Luxembourg SARL o.z.  
Tel: + 421 2 3355 5500

**Suomi/Finland**  
Pfizer Oy Animal Health,  
Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40

**Sverige**  
Pfizer Oy Animal Health,  
Tel: +358 (0)9 4300 40

**Latvija**

Pfizer Animal Health

Tel: +370 525 14000

**Lietuva**

Pfizer Animal Health

Tel: +370 525 14000

**United Kingdom**

Pfizer Ltd

Tel: +44 (0) 1304 616161