

**PRÍLOHA I**

**SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU**

## 1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Equip WNV - emulzia na injekciu pre kone

## 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

**1 dávka (1 ml) obsahuje:**

**Účinná látka:**

Inaktivovaný vírus West Nile, kmeň VM-2

RP\* 1,0 – 2,2

\*Relatívna účinnosť stanovovaná *in vitro* metódou v porovnaní s referenčnou vakcínou, ktorá bola účinná u koní.

**Adjuvans:**

MetaStim™ (SP Oil)

0,05 ml

Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.

## 3. LIEKOVÁ FORMA

Injekčná emulzia.

## 4. KLINICKÉ ÚDAJE

### 4.1 Cieľový druh

Kone.

### 4.2 Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu

Na aktívnu imunizáciu koní od veku 6 mesiacov a starších proti vírusu West Nile na zníženie počtu koní s virémiou.

Nástup imunity: 3 týždne po primovakcinácii.

Trvanie imunity: 12 mesiacov po primovakcinácii.

### 4.3 Kontraindikácie

Žiadne.

### 4.4 Osobitné upozornenia <pre každý cieľový druh>

Žiadne.

### 4.5 Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie

#### Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat

Vakcinovať len zdravé zvieratá.

Vakcinácia môže zasahovať do existujúceho sero-epidemiologického prieskumu.

Zatiaľ čo IgM odpoveď po vakcinácii je zriedkavá, pozitívne výsledky IgM-ELISA testu sú silným indikátorom prirodzenej nákazy vírusom West Nile. Ak je podozrenie na infekciu u zvieratá po vakcinácii, je potrebné dotestovať IgM protilátky a stanoviť, či bolo zviera skutočne infikované alebo vakcinované.

Neboli urobené špecifické štúdie, ktoré by dokazovali interferenciu materských protilátok s protilátkami po vakcinácii. Preto sa odporúča nevakcinovať skôr ako od 6. mesiaca veku.

#### **Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám**

V prípade náhodného samoinjikovania, požitia, poliatia sa na koži, vyhľadať ihneď lekársku pomoc a ukázať písomnú informáciu pre používateľa alebo obal lekárovi.

#### **4.6 Nežiaduce účinky (frekvencia výskytu a závažnosť)**

Pri malom počte zvierat môžeme pozorovať prechodné miestne reakcie vo forme mierneho opuchu v mieste vpichu (s priemerom maximálne 1 cm), ktorý vymizne spontánne o 1 – 2 dni. Niekedy je miesto bolestivé a zviera môže trpieť miernou depresiou. V niektorých prípadoch sa môže objaviť 2 dni po podaní zvýšenie telesnej teploty.

#### **4.7 Použitie počas gravidity, laktácie, znážky**

Vakcína môže byť použitá počas gravidity a laktácie.

Neboli urobené špecifické štúdie u gravidných zvierat.

V súvislosti s tým nemôže byť vylúčené, že prechodné zníženie imunity pozorované v čase gravidity neovplyvní reakcie na vakcínu.

#### **4.8 Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia**

Nie sú dostupné žiadne informácie o bezpečnosti a účinnosti zo súbežného použitia tejto vakcíny s niektorými ďalšími. Rozhodnutie či použiť túto vakcínu pred alebo po podaní iného veterinárneho lieku musí byť preto zvážené prípad od prípadu.

#### **4.9 Dávkovanie a spôsob podania lieku**

Aplikácia intramuskulárne.

Aplikuje sa 1 dávka (1 ml) hlboko intramuskulárne do svaloviny v oblasti krku.

##### Vakcinačné schéma:

Primovakcinácia: prvá injekcia od 6. mesiaca veku, druhá injekcia o 3 – 5 týždňov.

Revakcinácia: dostatočný stupeň ochrany je dosiahnutý po každoročnej booster vakcinácii jednou dávkou, aj keď táto schéma vakcinácie nebola úplne overená.

#### **4.10 Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy, antidotá) ak sú potrebné**

Po podaní dvojnásobnej dávky vakcíny neboli pozorované žiadne iné nežiaduce účinky, ako boli popísané v bode 4.6.

#### **4.11 Ochranná lehota**

Bez ochrannej lehoty.

## **5. IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI**

Farmakoterapeutická skupina: Imunologický liek pre Equidae - Inaktivované vírusové vakcíny – Vakcína West Nílskeho vírusu

kód ATC vet: QI05AA10

Vakcína stimuluje aktívnu imunitu proti západonílskemu vírusu.

## **6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE**

### **6.1 Zoznam pomocných látok**

Médium MEM

### **6.2 Inkompatibility**

Tento liek nemiesať s akýmkoľvek iným veterinárnym liekom.

### **6.3 Čas použiteľnosti**

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v pôvodnom obale: 2 roky.

### **6.4 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie**

Uchovávať a prepravovať v chlade (2°C - 8°C).

Chrániť pred mrazom.

Chrániť pred svetlom.

### **6.5 Charakter a zloženie vnútorného obalu**

Sterilná jednodávková polypropylénová striekačka uzatvorená latex neobsahujúcou zátkou typu I.

1 x 5 jednodávkových striekačiek.

1 x 10 jednodávkových striekačiek.

1 x 25 jednodávkových striekačiek.

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

### **6.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre zneškodňovanie nepoužitých veterinárnych liekov, prípadne odpadových materiálov vytvorených pri používaní týchto liekov.**

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto veterinárneho lieku musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi.

## **7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCI**

Pfizer Limited  
Ramsgate Road  
Sandwich, Kent  
CT13 9NJ  
Veľká Británia

## **8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO**

EU/2/08/086/001  
EU/2/08/086/002  
EU/2/08/086/003

**9. DÁTUM PRVÉHO ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII ALEBO DÁTUM PREDĹŽENIA PLATNOSTI ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII**

21/11/2008

**10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU**

Podrobné informácie o tomto veterinárnom lieku sú uvedené na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky <http://www.ema.europa.eu/>.

**ZÁKAZ PREDAJA, DODÁVOK A/ALEBO POUŽÍVANIA**

Dovoz, predaj, dodávky a/alebo používanie Equip WNV sú alebo môžu byť zakázané v určitých členských štátoch na celom alebo časti ich územia v súlade s národnou politikou zásad ochrany zdravia zvierat. Každá osoba, ktorá má v úmysle dovážať, predávať, dodávať a/alebo používať Equip WNV sa musí poradiť s príslušným orgánom členského štátu o aktuálnych vakcinačných zásadách ešte pred dovozom, predajom, dodávkou a/alebo použitím.

## **PRÍLOHA II**

- A. VÝROBCA BIOLOGICKEJ ÚČINNEJ LÁTKY A DRŽITEĽ POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÝ ZA UVOĽNENIE ŠARŽE**
- B. PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA**
- C. STANOVENIE MAXIMÁLNEHO LIMITU REZÍDUÍ (MRL)**
- D. OSOBITNÉ PODMIENKY A POŽIADAVKY REGISTRÁCIE**

## **A. VÝROBCABIOLÓGICKEJ ÚČINNEJ LÁTKY A VÝROBCAZODPOVEDNÝ(-Í) ZA UVOĽNENIE ŠARŽE**

### Meno a adresa výrobcu biologickej účinnej látky

Boehringer Ingelheim  
Vetmedica, Inc.  
141 East Riverside Drive  
Fort Dodge, Iowa 50501  
USA

### Meno a adresa výrobcu zodpovedného za uvoľnenie šarže

Elanco Animal Health Ireland Limited  
Finisklin Industrial Estate  
Sligo  
Írsko

## **B. PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA**

Vydáva sa len na veterinárny predpis.

V súlade s článkom 71 smernice 2001/82/ES Európskeho parlamentu a Rady môže ktorýkoľvek členský štát, v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi, zakázať výrobu, dovoz, držanie, predaj, dodávanie a/alebo používanie imunologických veterinárnych prípravkov na časti svojho územia alebo celom území, ak sa zistí, že:

- a) podávanie veterinárneho lieku zvieratám bude narúšať výkon národného programu diagnostiky, ozdravovania alebo zvládania chorôb zvierat, alebo spôsobí ťažkosti pri osvedčovaní neprítomnosti kontaminácie živých zvierat alebo potravín získaných z liečených zvierat.
- b) choroba, proti ktorej veterinárny liek vyvoláva imunitu, sa na príslušnom území nevyskytuje vo veľkom rozsahu.

## **C. STANOVENIE MAXIMÁLNEHO LIMITU REZÍDUÍ (MRL)**

Účinná látka biologického pôvodu určená na vyvolanie aktívnej imunity nespadá do rámca Nariadenia (EK) č. 470/2009.

Pomocné látky (vrátane adjuvantov) uvedené v časti 6.1 SPC sú buď povolené látky zaradené do tabuľky 1 Prílohy Nariadenia Komisie (EÚ) č. 37/2010 pre ktoré MRL nie sú požadované alebo nespádajú do rámca Nariadenia (EK) č. 470/2009 keď sú použité vo veterinárnom lieku.

## **D. OSOBITNÉ PODMIENKY A POŽIADAVKY REGISTRÁCIE**

System dohľadu nad liekmi

Držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku musí zabezpečiť zavedenie systému dohľadu nad liekmi, ako je popísané v časti I žiadosti o registráciu ako aj jeho fungovanie pred uvedením lieku na trh a počas celého obdobia, pokiaľ je liek na trhu.

### **PRÍLOHA III**

#### **OZNAČENIE OBALU A PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV**

## **A. OZNAČENIE OBALU**

## ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Škatuľa s 5, 10 alebo 25 kusmi 1-dávkových injekčných striekačiek.

### 1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Equip WNV emulzia na injekciu pre kone.

### 2. ZLOŽENIE: ÚČINNÉ LÁTKY A POMOCNÉ LÁTKY

**1 dávka (1 ml) obsahuje:**

**Účinná látka:**

Inaktivovaný vírus West Nile, kmeň VM-2

RP\* 1,0 – 2,2

\*Relatívna účinnosť stanovovaná *in vitro* metódou v porovnaní s referenčnou vakcínou, ktorá bola účinná u koní.

**Adjuvans:**

MetaStim™ (SP Oil)

0,05 ml

### 3. LIEKOVÁ FORMA

Emulzia na injekciu

### 4. VEĽKOSŤ BALENIA

1 x 5 jednodávkových striekačiek.

1 x 10 jednodávkových striekačiek.

1 x 25 jednodávkových striekačiek.

### 5. CIEĽOVÝ DRUH

Kone.

### 6. INDIKÁCIA

Na aktívnu imunizáciu koní od veku 6 mesiacov a starších proti vírusu West Nile na zníženie počtu koní s virémiou.

### 7. SPÔSOB A CESTA PODANIA LIEKU

Na intramuskulárnu aplikáciu.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

### 8. OCHRANNÁ LEHOTA

Ochranná lehota: bez ochranej lehoty.

**9. OSOBITNÉ UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ**

**10. DÁTUM EXSPIRÁCIE**

EXP {mesiac/rok}

**11. OSOBITNÉ PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE**

Uchovávať a prepravovať v chlade (2 – 8 °C).  
Chrániť pred mrazom.  
Chrániť pred svetlom.

**12. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY**

Zneškodnenie: Prečítajte si písomnú informáciu pre používateľov.

**13. OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“ A PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, ak sa uplatňujú**

Len pre zvieratá - vydáva sa len na veterinárny predpis.

Dovoz, predaj, dodávanie a/alebo používanie tohto veterinárneho lieku sú alebo môžu byť zakázané v určitých členských štátoch na celom alebo časti ich územia. Ďalšie informácie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľov.

**14. OZNAČENIE „UCHOVÁVAŤ MIMO A DOHĽADU DOSAHU DETÍ“**

Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí.

**15. MENO A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII**

Pfizer Limited  
Ramsgate Road  
Sandwich, Kent  
CT13 9NJ  
Veľká Británia

**16. REGISTRAČNÉ ČÍSLO**

EU/2/08/086/001  
EU/2/08/086/002  
EU/2/08/086/003

**17. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE**

č. šarže

**MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE**

**Injekčná striekačka- 1 dávka (1 ml)**

**1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU**

Equip WNV emulzia na injekciu pre kone

**2. MNOŽSTVO ÚČINNEJ LÁTKY**

Inaktivovaný vírus West Nile, kmeň VM-2 (RP = 1,0 – 2,2)

**3. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH**

1 ml

**4. SPÔSOB PODANIA LIEKU**

intramuskulárne

**5. OCHRANNÁ LEHOTA**

Ochranná lehota: bez ochrannej lehoty.

**6. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**7. DÁTUM EXSPIRÁCIE**

EXP{mesiac/rok}

**8. OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“**

Len pre zvieratá.

## **B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV**

## PÍ SOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

**Equip WNV**  
Injekčná emulzia  
Pre kone

### 1. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ IDENTICKÍ

Držiteľ povolenia na uvedenie na trh:

Pfizer Limited  
Ramsgate Road  
Sandwich, Kent  
CT13 9NJ  
Veľká Británia

Držiteľ povolenia na výrobu zodpovedný za uvoľnenie šarže:

Elanco Animal Health Ireland Limited  
Finisklin Industrial Estate  
Sligo  
Írsko

### 2. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Equip WNV emulzia na injekciu pre kone

### 3. ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA A INÉ ZLOŽKY

**1 dávka (1 ml) obsahuje:**

**Účinná látka:**

Inaktivovaný vírus West Nile, kmeň VM-2

RP\* 1,0 – 2,2

\*Relatívna účinnosť stanovovaná *in vitro* metódou v porovnaní s referenčnou vakcínou, ktorá bola účinná u koní.

**Adjuvans:**

MetaStim™ (SP Oil)

0,05 ml

### 4. INDIKÁCIA

Na aktívnu imunizáciu koní od veku 6 mesiacov a starších proti vírusu West Nile na zníženie počtu koní s virémiou.

Nástup imunity: 3 týždne po primovakcinácii.

Trvanie imunity: 12 mesiacov po primovakcinácii.

### 5. KONTRAINDIKÁCIE

Žiadne.

### 6. NEŽIADUCE ÚČINKY

Pri malom počte zvierat môžeme pozorovať prechodné miestne reakcie vo forme mierneho opuchu v mieste vpichu (s priemerom maximálne 1 cm), ktorý vymizne spontánne o 1 – 2 dni. Niekedy je miesto bolestivé a zviera môže trpieť miernou depresiou. V niektorých prípadoch sa môže objaviť 2 dni po podaní zvýšenie telesnej teploty.

Ak zistíte akékoľvek vážne účinky alebo iné vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii, informujte vášho veterinárneho lekára.

## **7. CIELOVÝ DRUH**

Kone.

## **8. DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA (-Y) A SPÔSOB PODANIA LIEKU**

Na intramuskulárne podanie:

Aplikuje sa 1 dávka (1 ml) hlboko intramuskulárne do svaloviny v oblasti krku.

Vakcinačná schéma:

Primovakcinácia: prvá injekcia od 6. mesiaca veku, druhá injekcia o 3 – 5 týždňov.

Revakcinácia: dostatočný stupeň ochrany je dosiahnutý po každoročnej booster vakcinácii jednou dávkou, aj keď táto schéma vakcinácie nebola úplne overená.

## **9. POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ**

Neuplatňuje sa.

## **10. OCHRANNÁ LEHOTA**

Bez ochranej lehoty.

## **11. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE**

Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávať a prepravovať v chlade (2 °C – 8 °C).

Chrániť pred mrazom.

Chrániť pred svetlom.

## **12. OSOBITNÉ UPOZORNENIA**

Vakcinovať len zdravé zvieratá.

Nie sú dostupné žiadne informácie o bezpečnosti a účinnosti zo súbežného použitia tejto vakcíny s niektorými ďalšími. Rozhodnutie či použiť túto vakcínu pred alebo po podaní iného veterinárneho lieku musí byť preto zvažované prípad od prípadu

Použitie Duvaxyn<sup>®</sup> WNV znižuje počet koní s virémiou po prirodzenej nákaze, ale nemusí systematicky ochrániť pred infekciou týmto vírusom.

### **Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat**

Vakcinácia môže zasahovať do existujúceho sero-epidemiologického prieskumu. Zatiaľ čo IgM odpoveď po vakcinácii je zriedkavá, pozitívne výsledky IgM-ELISA testu sú silným indikátorom prirodzenej nákazy West Nile vírusom. Ak je podozrenie na infekciu u zvierat'a po vakcinácii, je potrebné dotestovať IgM protilátky a stanoviť, či bolo zviera skutočne infikované alebo vakcinované.

Neboli urobené špecifické štúdie, ktoré by dokazovali interferenciu materských protilátok s protilátkami po vakcinácii. Preto sa odporúča nevakcinovať skôr ako od 6. mesiaca veku.

Vakcína môže byť použitá počas gravidity a laktácie.

Neboli urobené špecifické štúdie u ťarchavých zvierat.

V súvislosti s tým nemôže byť vylúčené, že prechodné zníženie imunity pozorované v čase gravidity neovplyvní reakcie na vakcínu.

### **Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám**

V prípade náhodného samoinjikovania, požitia, poliatia sa na koži, vyhľadať ihneď lekársku pomoc a ukázať písomnú informáciu pre používateľa alebo obal lekárovi.

### **13. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY**

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto veterinárneho lieku musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi.

### **14. DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍ SOMNEJ INFORMÁCII PRE POUŽÍVATEĽOV**

Podrobné informácie o tomto lieku sú uvedené na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky <http://www.ema.europa.eu/>.

### **15. ĎALŠIE INFORMÁCIE**

Len pre zvieratá.

Vydáva sa len na veterinárny predpis.

1 x 5 jednodávkových striekačiek.

1 x 10 jednodávkových striekačiek.

1 x 25 jednodávkových striekačiek.

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

Dovoz, predaj, dodávky a/alebo používanie Equip WNV sú alebo môžu byť zakázané v určitých členských štátoch na celom alebo časti ich územia v súlade s národnou politikou zásad ochrany zdravia zvierat. Každá osoba, ktorá má v úmysle dovážať, predávať, dodávať a/alebo používať Equip WNV sa musí poradiť s príslušným orgánom členského štátu o aktuálnych vakcinačných zásadách ešte pred dovozom, predajom, dodávkou a/alebo použitím.

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa povolenia na uvedenie na trh.

**België/Belgique/Belgien**  
Pfizer Animal Health s.a.,  
Tél. /Tel: +32 (0)2 554 62 11

**Република България**  
Pfizer Luxembourg SARL  
Тел: + 359 2 970 41 71

**Česká republika**  
Pfizer Animal Health  
Tel: +420 283 004 111

**Danmark**  
Pfizer Oy Animal Health,  
Tlf: +358 (0)9 4300 40

**Deutschland**  
Pfizer GmbH  
Tel: +49 30-5500 5501

**Eesti**  
Pfizer Animal Health  
Tel: +370 525 14000

**Ελλάδα**  
Pfizer Hellas A.E.  
Τηλ.: +30 210 6785800

**España**  
Pfizer S.L.  
Tel: +34 91 4909900

**France**  
Pfizer  
Tél: +33 (0)1 58 07 46 00

**Ireland**  
Pfizer Healthcare Ireland, Trading As:  
Pfizer Animal Health  
Tel: +353 (0) 1 467 6500

**Ísland**  
Pfizer Oy Animal Health,  
Sími: +358 (0)9 4300 40

**Italia**  
Pfizer Italia S.r.l.,  
Tel: +39 06 3318 2933

**Κύπρος**  
Pfizer Hellas A.E.  
Τηλ.: +30 210 6785800

**Latvija**  
Pfizer Animal Health  
Tel: +370 525 14000

**Luxembourg**  
Pfizer Animal Health s.a.,  
Tél. /Tel: + 32 (0)2 554 62 11

**Magyarország**  
Pfizer Kft.  
Tel: +361 488 3695

**Malta**  
Agrimed Limited  
Tel: +356 21 465 797

**Nederland**  
Pfizer Animal Health B.V.,  
Tel: +31 (0)10 4064 600

**Norge**  
Pfizer Oy Animal Health,  
Tlf: +358 (0)9 4300 40

**Österreich**  
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.  
Tel: +43 (0)1 52 11 57 20

**Polska**  
Pfizer Trading Polska Sp. z.o.o.  
Tel: +48 22 335 61 00

**Portugal**  
Laboratórios Pfizer, Lda.  
Tel: +351 21 423 55 00

**Romania**  
Pfizer Romania SRL  
Tel: + 0040 21 207 28 00

**Slovenija**  
Pfizer Luxembourg SARL  
Tel: +386 (0) 1 52 11 670

**Slovenská republika**  
Pfizer Luxembourg SARL o.z.  
Tel: + 421 2 3355 5500

**Suomi/Finland**  
Pfizer Oy Animal Health,  
Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40

**Sverige**  
Pfizer Oy Animal Health,  
Tel: +358 (0)9 4300 40

**United Kingdom**  
Pfizer Ltd  
Tel: +44 (0) 1304 616161

**Lietuva**  
Pfizer Animal Health  
Tel: +370 525 14000